

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百六十五

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆 珙

校對官中書臣朱 忻

謄錄監生臣汪 緣

欽定四庫全書

普濟方卷三百六十五 明

周王朱橚 撰

嬰孩唇舌口齒咽喉門

唇瘡等疾

附論

夫脾與胃合爲足陽明其經脉起鼻環于唇其支脉入
絡于脾脾胃有熱氣則發于唇生瘡而重被風邪寒溫
之氣搏于瘡則微腫濕爛或冷或熱乍瘡乍發積月累
年謂之緊唇亦名瀼唇也 凡小兒唇青候者蓋因藏

氣不和血虛為冷所乘即口唇青肥亦有藏氣熱唇生瘡而風冷之氣入瘡雖瘡之後血色不復故令唇青

方

順脾散 治唇瘡未已復被風冷所搏瘡口濕腫此名

緊唇

山藥

一兩

人參

三分

桂

去麤皮

一分

木香

半兩

甘草

炙

白朮

剉

各

一

各

一

分訶梨勒

炮去核

半兩

肉豆蔻

炮去殼

二枚

白茯苓

去黑皮

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

耆

剉各

白芷

半兩

分

一

一

一

一

一

一

一

一

一

右件為散每服半錢沸湯點服量兒大小加減

黃連散

治小兒緊唇因五藏熱毒氣上衝唇腫反齔

黃連

去鬚

甘草

生剉

寒水石

黃蘗

剉各半兩

枳榔

一分

右為散鍊蜜調塗于唇上一日兩三度換之

葵根散

出仁好方

治緊唇病

葵根

燒灰一兩

烏蛇

燒灰

黃蘗

剉末

鱉甲

燒灰研各半兩

右研勻每用半錢以猪脂少許和塗唇上日數易之

治緊唇

用亂髮蜂房及六畜毛燒作末傅瘡上猪脂

和亦佳

治小兒緊唇及口瘡方 以馬芥子搗汁先揩唇血出
傅上日七遍馬芥即刺芥也

治小兒緊唇 搗刺薊取汁煎令濃先以物揩唇上血
即塗之

又方 爛嚼澤蘭心安唇上良

治緊唇及藩唇

出千金方

用纏白布作大燈炷如指安芥

及上燃炷令及汗出拭取傅唇上日二三度一方用

青布燒灰以酒服之亦可脂和塗唇上並瘡

治唇生核 用猪屎平量一升以水投絞取汁溫服之

治小兒緊唇 搗赤芎取汁洗之

又方

出聖惠方

以葵根燒灰為末以酥調封之

又方

出聖惠方

燒自死螻蛄灰細研水調傳之

又方

出聖惠方

用炙松脂貼之

又方

出聖惠方

用乾蟻螯燒灰細研以猪脂和卧塗之差

又方

燒鱉甲令煙盡細研酥調傳之

烏蛇散

出聖惠方

治緊唇及脾熱攻唇瘡腫

用烏蛇燒

灰細研以酥和傅唇上頻換為効一方用皮燒灰傅

之

又方

出聖惠方

燒鷄屎白作末傅之有涎易之

白芨膏

治小兒唇瘡

白芨

白欽

白蠟

各一兩

黃耆

剉

乳香

研

牡丹皮

芍藥

丁香

各一分

麻油

二兩

右除油蠟外並細剉先煎麻油令沸次入前項藥以

柳木枝不住手攪綿濾過去滓再煎入蠟膏成銀石器中盛候冷不拘多少取傅瘡上

龍膽丸 治小兒唇瘡不合

龍膽

大黃

劉微炒
各一分

人參

梔子

朴硝

郁李

人

去皮別研
入各半兩

茵陳蒿

一分

右為末鍊蜜和丸如麻子大每服五丸至七丸溫水下量兒大小加減

治小兒百日內無故唇口青不能飲乳

大藍

採取陰乾

菱霄

牙硝

蜀大黃

各一分

右為散以羊髓為丸將一九研碎灌之便可喫乳熱者可服而寒者難用也昔人休官去後曾遊湖湘三江長憶雲水修合此方特行救懸危者千餘人皆表功効殊妙

治唇黑腫痛癢不可忍方

幼幼新書

取四文大錢于磨石

上以臘月猪脂磨取汁塗之不過數遍即愈

又方以竹弓彈之出其惡血立効

療小兒唇腫及口赤生白瘡爛方 以清旦研桑木白

皮取汁以塗兒唇口即瘥

治唇瘡及卒生瘡或痛癢 用黃蘗去麤皮為細末濃

煎薔薇根汁調塗瘡上立効

治唇瘡 用蘭葉研取汁洗之日三上瘥

治小兒唇口吻生瘡 以新瓦擣羅為末以生油調塗之

治冬月唇乾折血出方 擣桃仁以猪脂和傅之

治遠行唇口面皴裂方
用熟煎猪脂將行夜常傅面
設行萬里野宿不損

口瘡等疾

附論

夫嬰孩口舌生瘡乃心脾受熱流沫煩啼盛則不乳然
嬰兒吮乳之初口内生白煩燥駭人者莫知其由將謂
神祟使之究竟其理母于未誕之月恣飲酣醕貪食肥
膩熱毒胎氣所受其兒脫胎之後所襲熱毒之氣悉皆
散出于表舌系于心唇干於脾所言心脾若是也欲以

下其氣未可利臟腑但以吳茱萸末米醋調傅腳心移
夜即愈藥性雖熱能引熱就下其功至良又有心肺熱
者瘡潰頤頰初作數點胭脂紅漸散斑駁如丹加之身
體有熱連翹飲主之但禁火氣餘無恙矣 小兒口瘡
由血氣盛兼將養過溫心有客熱熏上焦故口生瘡也
千金翼曰凡口瘡忌鹹膩及熱麵乾棗等宜純食甜粥
勿食塩菜三日即瘥又口中面上生息肉轉大以刀決
潰出濃愈由血氣盛實心脾蘊熱熏發上焦故口生瘡

蓋小兒純陽易生熱疾或衣服過厚飲食多熱血脉壅
盛皆致此疾 驚口瘡者此由脾胃有客熱熱氣薰發
于口兩吻生瘡其白色如驚子之吻故名為驚口瘡也
或以驚泥傳之甚良 鵝口候者由小兒初生口裏白
屑滿舌如鵝之口故曰鵝口也此乃胎熱而心脾最盛
薰發于口也 小兒初生口裏忽結生于舌上如黍粟
大令兒不能飲乳名之口噤此由在胎之時熱入兒心
脾心脾偏受于熱故令口噤者也

方

薔薇丸

治口中瘡身體有熱氣痲癰

薔薇根

黃芩

鼠李根

當歸

葛根

白欬

石龍芮

黃蘗

黃耆

芍藥

續斷

黃連

各一
兩 括蔞根 二
兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大十九日三服一方無

黃連

升麻散

治小兒口瘡多時氣臭生蟲子

川升麻 黃芩 藁本 甘草 生乾地黄 五

倍子各一分 皂莢 訶梨勒皮 夏枯草已上三味燒灰各半

兩

右為散候兒睡時即乾摻于瘡上神効

治小兒久患口瘡不瘥

蝦蟇塗酥炙微黃 筍灰各半兩 白礬 黃蘗剉 黃連去鬚 晚

蠶蛾微炒 川升麻各一分 蝸牛三已枚去殼微炒

右為散每取少許以白蜜和如膏塗于瘡上日三用

之

龍膽丸

治小兒口瘡多睡吐乳

方見唇瘡等疾類

折桂散

治口瘡口吻病

梧桐津

黃蘗

蜜炙

蛤粉

各一分

晚蠶蛾

一錢微炒

已上擣羅為細末次用

朱砂

半兩兩細研水飛

麝香

一錢研

龍腦

半錢研

右研勻每用少許摻貼患處

保生丸

歌曰小兒心歲不清涼客壅傷神饒口瘡鉤

引重舌難言語涎流不斷似流漿待教食乳搖頭怕
夜啼聲哭斷肝腸五膽三黃除客熱七香金薄甚為
良

大黃 黃蘗 為末別研 宣黃 各一分半 丁香 一錢 麝香 一字 金

薄 五片以水銀結為砂子

右研細棗肉為丸如皂子大溫水化下一粒

黃連散 治小兒口瘡心熱煩悶

黃連 去鬚 大青 川升麻 各三分 桑根白皮 剉 甘草 炙

赤劉
半兩

右為散每服壹錢以水小盞煎至五分去滓放溫量
兒大小分減服之若與妳母服即加梔子黃芩各半
兩每服三錢以水一中煎至六分去滓食後溫服

鉛丹膏 治小兒口瘡

鉛丹

一分

鉛霜

半

晚蠶蛾

微炒

蛤粉

各半錢

麝香

一分

錢

右研令極細用蜜二兩熬成膏每上取膏半錢塗在

口中

又方

麝香

梧桐津

晚蠶蛾

微炒

黃蘗

末各一分

朱砂

半分

右為末每夜臨臥時于瘡上薄貼之不過三夜瘡

青黛散

治小兒口瘡

青黛

甘草

生用

黃連

香白芷

密陀僧

醋燒別

研各等

分

右為末每用摻口內

治小兒口瘡

青黛 黃連

各一錢

白殭蠶 三馬屁勃

拳大

右為末乾摻先用茱萸湯洗脚心又醋麵糊調茱萸

末塗于脚上

治口傍惡瘡

亂髮灰 胡絲灰 黃連 乾薑

各等分

右為散以粉瘡上不過三日立愈

治小兒口瘡腫痛

麝香

半分細研

蜜

半兩

甘丹

一分

生地黃汁

一合

右先將三味入銚子以慢火熬令紫色次下麝香勻攪候冷日三度塗于瘡上

紫金霜方 治大人小兒口瘡

黃蘗

如兩指大二片塗蜜慢火炙令紫色

訶子

一枚燒過蓋子蓋少時

麝香

膩粉

各少許

右為末每服二字摻于舌上立瘥

黃連含湯 治小兒口瘡如月蝕狀赤黑似瘤有竅如

有蟲吮之有血

黃連

礬石

細辛

各二分

藜蘆

一分

右以水三升煮一合令兒含滿口冬可煖之兒大解語可用含之但以綿搵拭瘡上

胡黃連散

治口糜

胡黃連

五分

藿香

一錢

細辛

三錢

宣連

三錢

右為末每用半錢乾貼口內漱吐之

治口舌生瘡 其證乳到兒口即啼及喫乳不穩 以

竹瀝汁點黃連黃栢虢丹煨塗口中

一捻散 治小兒口瘡

青黛 黃蘗

去麁皮

訶黎勒

炮去核

蜜陀僧

右研為散取一捻糝舌上如咽喉內有瘡亦糝喉中
微微嚥津

白芷散 治小兒口瘡

香白芷

半兩

鹽綠

一錢

五倍子

一分

麝香

少許

右研為細末每用一字糝瘡上

瀉心散 治口瘡

黃連 草烏 白薑

各等分

右為末乾糝先用井花水洗去白膜一方加腦子麝香礬砂為末每服一字溫水臨臥服之

碧玉通神散 治口瘡

黃栢

蜜塗炙取末半兩

青黛

一分腦子少許

右和勻候兒睡着乾糝口中及置舌下嚥之一方無腦子一方宜服洗心散瀉心散

治小兒口瘡 用桑白汁生地黃汁蜜各半合相和緩

緩細傳兒口取瘡

治口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

猪膏

白蜜

各一斤

黃連

一兩切

右合煎去滓令相得含如半棗日四五夜二

治小兒口瘡腫痛

蟾酥

石膽

各半錢

黃蘗

二錢末

右細研令勻鍊蜜和丸如皂莢子大每夜以水化一丸如飴相似以篋子抹在口中每夜一兩上不過兩

夜瘡一法用鵝毛蘸掃患處

治小兒口瘡

芍藥 當歸

黃連

各等分

右乳汁浸塗口中

治口瘡

鬱金

雄黃

研

甘草

半炙半生
各一兩

右為末同和糝瘡上有涎吐之每用少半錢許又以

蛤粉水調塗脚心亦妙

治小兒口瘡

赤芍藥

川大黃

宣連

各等分

右為末獺猪膽調塗顙門上一日兩次換一方有鬱

金無宣連

綠袍散 治大人小兒口瘡多時不效者

黃蘗

二兩

甘草

炙二兩

青黛

一兩

右為末入青黛同研勻乾貼瘡上

治小兒口瘡 用蒲黃蟬蛻去泥土為末打和用蜜少

許甌上蒸過一頃時點入口中

寒水石散 治小兒口瘡

寒水石

一分燒通赤地上碗合一宿出火毒

白礬

熬令汁枯一分

鉛白霜

一分

右為散每用少許糝口瘡上食後臨臥以瘥為度
津無妨

硼砂散 治小兒口瘡

硼砂

研

礬蝴蝶

研

蜜陀僧

各半錢研

右用生蜜四兩與藥同熬紫色以新水冰冷瓷合盛

每用以鷄翎傳之

鉛丹煎 治小兒口瘡

鉛丹

半兩

蜜陀僧

半兩

白蜜

四兩

右先以蜜于銚子煎令沸下鉛丹同煎令紫色次下蜜陀僧攪令勻成煎於瓷合盛每用小豆大燕津一

方熬成膏鵝毛塗効

大効金絲膏

一名石膽散

治小兒口瘡

黃丹

一錢

生蜜

一兩

右相和深甌盛甌內蒸令黑為度每用少許鷄毛刷
蘸口內甚効

牡蠣散 治小兒口瘡

甘草

炙一錢末

牡蠣

煅通紅取出候冷研細以紙裹了埋一尺土中七日出火氣三錢

右和勻頻用少許糝口中或嚥或吐皆妙

療小兒口瘡

黃蘗皮

一兩切

烏頭

一升

右以水二升煮取兩合去滓重煎如飴入少許龍腦

研和傳之甚良

治小兒一切口瘡疼痛

沒石子

三分微火炙令虛服

甘草

一分

右為散每于瘡上薄糝令遍

晚蠶蛾散

治小兒百日以上二三歲以來患口瘡

晚蠶蛾

一分微炒

麝香

半分

右細研為散每用少許糝于瘡上日再用之一方及

治風疳等瘡無麝香

治小兒口瘡

水銀一分黃連六分

右以水二升半煮五合兒小不能含以綿搵拭口中

日十遍

石膽散 治口瘡

石膽不以多少龍腦少許

右為末糝之

治大人小兒口瘡

柴胡

吳茱萸

各等分

右為細末每用一錢好酒調塗脚心男左女右

治妳下小兒口瘡

烏頭尖

七個

天南星

一個

右為末以藥合生薑汁調于男左女右脚心內塗之
不過三兩次立愈

升麻散

治小兒口瘡

升麻

黃連

各半兩

右為末乾糝之

治口瘡

銅綠

一錢
研細

白芷

末半
兩

右相和研勻日三度糝貼于瘡上

青液散 治小兒口瘡及鵝口重舌

青黛

一錢腦子

少許

右為細末每用少許傅于舌上一方用竹瀝和蜜調

敷舌上効

必效散

出濟生
拔萃方

治口糜

白礬

大黃等分

右為細末臨臥乾貼瀝涎盡溫水漱之

治小兒及老人虛人口瘡咽痛

吳茱萸

去浮
者炒地龍去土炒
各等分

右為末米醋入生麵調塗足心

吳內翰之孫初生而
患口瘡用此方神効

桂礬方

出聖
惠方

治口瘡舌靛言語不得

白礬

燒令
汁盡桂去麤皮
各一分

右研為末糝舌上即瘥

治小兒口下黃肥瘡及驚口并口内生瘡方 取羖羊
鬍燒作灰和臘月猪脂傅之角亦可用日三四上塗
之効

瀉心散

出聖
惠方

治口瘡及驚口黃肥瘡乃心臟積熱上

發于口乳母亦同服

用黃連一味去鬚為末蜜水

調下一方用蜜調蒸一炊久旋旋與兒服之一方加

草烏白姜各等分乾糝用井水洗去白漠

治口瘡

湯氏寶書

用蛇蛻皮以水浸軟頻拭口內瘡一兩

遍即瘡次用貼脚心藥傳之効

治口瘡喉閉

出金嬰方

以朴硝為末水調下

薔薇湯

幼幼新書

治積年口瘡不瘡 用薔薇根一升以

水七升煮取三升去滓含之久則吐之候定更含少

許入咽亦佳未睡以前含之三日不瘡更令含之以

瘡為度驗秘不傳也

治小兒口瘡通及風疳瘡蝕透者

幼幼新書

以白殭蠶炒

令黃色拭令蠶上黃肉毛為末用蜜和調傅之立効

治小兒口瘡

新書 幼

用角蒿灰貼瘡上

治小兒口中熱瘡

新書 幼

用故綿燒灰研為末傅口瘡

上

治口瘡

新書 幼

用鷄內金細末糝之立効

治大人小兒透舌口瘡及疳瘡

新書 幼

用柳木蛀虫

不以多少燒灰煙盡為度如無柳木雜木蟲亦得為

細末入麝香少許瘡上無時乾貼

治未滿月小兒口瘡 以沒石子細研少許置乳上令

兒吮之乳入口即啼取乳候少頃再用不過三次愈

治小兒口瘡 用蜜陀僧以文武火燒赤地上以碗蓋

出火毒為細末臨時乾糝患處一方用蜜陀僧末每

用一字蜜調塗唇上兒飮盡口瘡便安

又方 用絹帛先淨去帛漿灰却將絹帛蘸薄荷水拭

口內加少許朴硝尤佳

又方 以大栗熟煮每日常食効甚

又方貼藥 用茱萸末醋調貼兩腳心移夜即愈藥性

雖熱能引熱就下良一方紅茱萸搗爛貼腳板心

又方

一名到聖散

治口瘡 用大天南星去皮取中心如

龍眼大為細末醋塗腳心用唾津調貼亦可男左女
右一法塗兩腳底心以紙掩帛護之

蟾蜍散 治小兒口瘡 用蟾蜍一枚炙令焦擣羅為

散每用一字傳瘡上

牛膝酒 治小兒口瘡 用牛膝二兩切清酒二盞煎

至七分去滓分溫三服日二以瘥為度

治小兒口瘡 用五月五日蝦蟇炙杵末傅瘡上即瘥
兼治小兒唇瘡

治乳口瘡在口角上經月不瘥

桑葉

擣汁

當門子

末各少許

右細研塗之即瘥

胡粉散 治小兒驚口生瘡

胡粉

一分炒微黃

黃連

半兩末

右細研令勻傳于瘡上

治小兒驚口黃肥瘡 取驚窠土一分入麝香半錢研
勻臨臥傳之一方無麝香

治小兒驚口兩吻生瘡 燒髮灰和猪脂傳之

治口吻瘡方 以楸白皮濕貼之三四度瘡

又方 取經年葵根欲腐者彌佳燒作灰及熱傳之亦
治口瘡

又方 以新炊飯了甑及熱以唇口向甑唇口上熨之

二七下三兩上差止

治驚吻瘡 以白楊枯枝鉄上燒灰詣及熱傳之

治小兒吻瘡 以桑葉細剉大釜中煎取如赤糖塗之

胗黃散 治小兒驚口生瘡及鵝口者 用鷄胗黃皮

燒灰研為末以乳汁調半錢服之日三服

治小兒驚口黃肥瘡 取殺羊角燒灰以臘月猪脂傳

之瘡

朱磬散 治小兒初生鵝口其舌上有白屑如末者鼻

外亦有并不能乳如舌不有白膜如石榴子大令兒
語不發如鵝口并口噤

朱砂 枯礬

右研極細每用少許傳兒舌上每日三次用之一方
加牙硝一方傳藥于舌上日三上以亂髮洗舌上垢
頻令淨即瘥

治小兒鵝口不能乳及口瘡赤爛 用小兒父母亂髮
淨洗纏桃枝活取井水東向日以髮拭口中得口中

白乳以置水中七過瀝洗三朝作之

治小兒鵝口瘡 用髮纏指頭蘸井花水或溫水揩拭之睡時以黃丹煨出火氣糝于舌上如不脫可煮粟菰汗泠濃以綿纏筋頭拭之若春夏無粟菰可煮粟皮水如井花水法小兒初出復有連舌下有膜如石榴子中膈連其舌下以後令兒言語不轉可以爪摘斷之微有血出無害若血出不止可燒髮作灰末傅之立止

治小兒鵝舌瘡滿口白瘡乳食不進 以白鵝屎汁灌
口中熨口上脚底心者取白汁貼之即愈 砂塗舌
下日三度一方用手纏頭髮包鵝糞蘸水洗口內搗
出粘涎如此數次即愈

柘根煎 治小兒心熱口為生瘡重舌鵝口及驚鵝者
用柘根弓材亦佳以水五升煮取二升去滓更煎取
五合細細傳之數數為之良

治小兒鵝口 用桑白皮汁和胡粉傳之

治小兒鵝口不能飲乳 以黍米汁傳之

治小兒傳鵝口瘡 取桑東行根研汁塗之患處

治小兒鵝口亦治鵝口重舌 用細馬牙硝于舌上糝

大豆許日三五度

失笑散 治口瘡或唇裂破血出及小兒赤白口瘡作

熱疼立効

玄胡索 白殭蠶 各三錢 黃連 一錢 輕粉 炒二錢 麝香 炒一錢

字 鉛白霜 硃砂 黃蘗 各半錢

右為細末每用一捻乾貼舌上出涎再貼立効

鉛霜散 治上焦熱口生白瘡膈中疳氣

鉛白霜 粉霜 馬牙硝 朱砂

各二錢

右為末每服少許罨于口內

青金散 治小兒白口瘡忽惡狀似木耳

五倍子

出土四兩

青黛

四錢

右為細末好酒調鴉羽掃口向咽喉流入咽喉中瘡爛次日便下兼治痔瘡亦佳

粉紅散 治小兒白口瘡咽喉惡爛聲啞

乾胭脂

錢一
枯礬一
兩

右研勻每用一錢生蜜調如稀糊掃口瘡咽喉內咽
了藥來日大便退了瘡皮為驗

治小兒白口瘡

黃丹

一
兩
龍腦
字

右為末用蜜調傳于口中

聖惠治小兒驚口及重舌并生熱瘡方 右用以柘樹

根一握洗去土剉水煎濃汁去滓更煎令調日三四
上塗之

治小兒口中涎出 以白羊屎內口中

貝母散 治小兒白口瘡滿口如浸餅起者 以貝母

去心二兩為散先煮麴掇粥七斤抱孩兒門內坐逐
了掇粥撮兒口內瘡了棄門限外令犬喫藥末半錢
水五分蜜少許煎三服以藥糝貼日用三四次即瘥
治小兒口瘡不得吃乳

臘月猪脂

一斤

蜜

二斤

甘草

炙如指
大三寸

右合煎相含如棗大稍稍嚥之日三

治小兒口瘡不得吮乳

大青

銖十八

黃連

銖十二
翼用二兩

右以水二升煮取一升二合一服一合日三夜

一

金粉散

治小兒無故生口瘡不下乳食只于脚心塗

貼

黃蘗 天南星

各等分

右為末釀醋調塗兩足心欬嗽塗頂門

如聖散 治小兒口瘡不能喫乳者 用江子一粒或

二粒研爛不去油入朱砂或黃丹赤土少許剝開小

兒顙門貼在顙上如四邊起粟米泡以溫水洗去藥

恐成瘡便以菖蒲水洗之即安其効如神

治小兒口瘡不得吮乳 用礬石如鷄子大置醋中塗

兒足下二七遍愈

硫黃散 治小兒口瘡不能吮乳 用生硫黃為末新

汲水調貼手心脚心効即洗去

貼足方 治小兒口瘡不能吮乳者 用蜜陀僧細研

釅醋調塗兩足心瘡即洗去宜用綿帛蘸生薄荷水

拭口內炒一方加天南星同蜜陀僧二味為末調塗

亦妙

治小兒口瘡不得乳者 以地鷄搗水塗瘡即愈地鷄

扁蟲也磚下多有之

治小兒口噤

鹿角粉

大豆末

各等分

右乳貼乳上兒飲立瘥

二乳飲 治小兒口噤

驢乳

猪乳

各二升

右合煎一升五合服如杏人許三四服瘥

治小兒口噤不開舌不能吮乳方

出聖惠方

蜘蛛

一枚去足及口
炙令焦細研

猪乳合

右以猪乳和勻為三服徐徐灌之神効

治口噤赤者心噤白者肺噤

出千金方

用鷄屎白如棗大

綿裹以水合煮二服分服之一方治小兒驚口瘡用
溫酒和服之一方治小兒口噤吐沫不能乳哺取鷄
屎白如豆大三枚以水下瘥

治小兒十月內口噤

出聖惠方

以猪乳滴口中瘥

治小兒口噤胃胃熱氣

取蛇莓以汁灌口中死以再

活莓如有蛇殘者不得食

治小兒口噤體熱者及口噤吐沫不能乳哺者

出聖惠方

以東行牛口沫塗口中及頤上一方塗口中及額上

即効

治小兒初生著口噤不開不收乳者

出聖惠方

用赤足蜈

蚣一枚去足炙令焦細研如粉用半錢以猪乳二合

和之分三四服灌之瘥

小銀方 治小兒口噤其病在咽中如麻豆許令兒吐

沫不能哺乳以水銀如黍米大與兒服覺病無早晚

水銀下咽便愈以意量之不過麻子許為度也以意少加百日兒不可過如半麻子也

又方 取牛口齒草絞汁塗上瘡

又方 用雀兒糞一粒細研乳汁調下瘡

又方 取白牛糞塗口中瘡

又方 燒葛蔓灰細研以一字和乳汁點口中即瘡

治初生兒至七日以來口噤方 用牛黃一錢細研以竹瀝調一字灌之更以猪乳點口中差

雄黃散 治小兒口瘡爛痛不問赤白或生腮頰間或

生齒斷上

雄黃

朱砂

各細研

硝石

蚬蛇膽

黃連

去鬚

石

鹽

苦參

剉各一分

鷄屎礬

半

麝香

一錢細研

右為細末研令勻日可三五度塗之

石膽散

治小兒口瘡赤爛

石膽

半錢

蚬蛇膽

龍齒

各一分

右細研為散每用少許塗于瘡上日三用之以差為

度

治小兒口瘡赤爛

膩粉

錢一

黃蘗末

半兩

右相和令勻薄薄糝之

治小兒口瘡爛

幼幼新書

羊乳汁 黃連

右以乳汁浸黃連着口中三上愈

又方

幼幼新書

羊脂 薏苡根

各一兩

右煎熟去滓雞翎塗瘡上

神驗散 治小兒口瘡爛臭

寒衣麪

五錢 硝石

七錢

右同研過夜新水調藥半錢塗在紙花子上男左女
右貼于脚心

治小兒口瘡爛 用赤葵莖炙乾為末每用一字蜜和
含之

羊乳飲 治小兒口瘡赤爛 取羊乳五合令點口中

不過三兩上瘥一方取牝羊生乳含之一方治口瘡

驚癇疾亦以羊乳含之

治口乾

幼幼新書

羊脂

鷄子大

酒

半升

大棗

七枚

右合漬七日取棗食之瘥

治口乾除熱下氣

石膏

五合研

蜜

二升

右以水三升煮石膏取二升內蜜煮取二升去滓含如棗核大燕汁盡更含之

治口乾 用羊脂若猪脂雞子大辟于之內半升醋中漬一宿絞取汁含之佳

又方 用含一片梨即愈夜睡當時即定

又方 以木履尾內塘灰中令熱取柱兩吻各二七遍治口臭

橘皮

五分

木蘭皮

一分

桂心

二分

大棗

四十枚

去核

蒸之去皮

右為末以棗肉丸如桐子大每服二十九日二服稍
稍至三十九一方有芎十八銖

又方

桂心

甘草

炙等分

右為末三指撮酒服二十日香

又方

蜀椒

汗

桂心

各一兩

右為細末以酒服方寸匕二十日香

又方

新書 幼幼

濃煮細辛含汁令久及吐三日即愈

又方

新書 幼幼

用井花水三升嗽口吐廁中

治口瘡白漫漫

出千金方

先以父淨髮拭口次取桑汁塗

之

白礬散

出傳氏方

治鵝口瘡

白礬

硼砂

各一錢

朱砂

半錢

右為末燈心蘸點舌上下

治口瘡服藥無効者此方治鵝口瘡等神効

出傳氏方

草烏

吳茱萸

分各等

右為末蜜調塗貼脚心立効如神

又方

出傳氏方

升麻

朴硝

龍膽草

等分

右為末點服即安

赴筵散

出保嬰方

治小兒赤白口瘡用之立効

芝麻花

不以多少

右為末乾糝口內用五七遍立愈

治小兒重舌鵝口瘡 以鹿角炙熟熨之

小兒口瘡

葛氏肘後方

右燒黃葵花傳之良

惠眼觀證丹蜜膏治嗽嬰兒口瘡方

如如新書

右用黃丹

一分炒令紫黑色蜜一分同黃丹于飯上蒸兩次以竹篦子攪勻以手點少許入口

千金異又方 治口乾 右遇夜勿食酸食及熱麪

又方 用雄鵝糞眠倒者燒灰加射香末吹入口中

治小兒口瘡及風疳瘡等

小兒官氣方

取晚蠶蛾細研貼

瘡上妙

晚蠶即夏生者

封臍散

出衛生家保方

治小兒口瘡

細辛不拘多少為末

以醋調塗臍上

鵝口重舌口瘡

出鮑氏方

硼砂 朱砂 青黛 朴硝

少許

研水傳舌上下量與

治孩子口內瘡 右以鍋底墨細研非時指頭搽之

透水散 治胃膈熱口内生瘡

朴硝 龍粉 甘草

各一錢

右末乾糝入口內

治口瘡

鷄子黃 梧桐子

不以多少

二味燒灰刷入口中

金花散 治口瘡潮熱呷疾

雄黃 牙硝 鬱金 甘草 瓜蒌 乾葛

右為末一字新汲水薄荷水調下

生下滿月以前麻口

粉草

國丹

煨少許

攪勻蜜糖調刷瘡上

小兒口舌生瘡或生白胎皆心脾經熱

出永類
鈴方

用洗

心散服之自佳

又方 名鵝口瘡自内生出可治自外生內不治

出永
類鈴

方

用鵝所食草下青糞者濾汁加以糖調搽口中

効

舌腫等疾 附論

夫小兒重舌者心脾熱故也心候于舌而主于血脾之絡脉又出于舌下心火脾土二臟母子也有熱則血氣俱盛具壯輔于舌下近舌根生形如舌而短故謂重舌也小兒木舌其壯舌漸龐大若不急治滿口當塞殺兒也小兒初生六七日後血氣收斂成肉舌喉頰裏冷冷然爭也若喉舌上有物如蘆籜盛水狀者名懸癰有氣脹起者可以錦纏長針留兩處如粟米許大以刺

之冷氣洩去亦出潰黃血汁也一刺之止消息一日若不消又刺之不過三刺自消或除小小未消三刺之必自然得消也有着舌下者如此名重舌有着頰裏及上腭如此者名重腭有着齒斷者即名重斷皆刺之去血汁即瘥也 若舌上黑有數孔血出如涌泉此心藏病也 若弄舌者脾藏微熱舌絡紫色治法勿用冷藥下之當少與瀉黃散若肥實者用牛黃散治之 小兒重舌宜急治之刺法中論刺舌下兩邊出血後以藥治之

不然即滿口塞喉便致危殆經云血則腫熱砭射之先
宜砭射後以藥治之

方

治舌上黑有數孔血出如涌泉此藏病也

戎鹽 黃芩 黃蘗 大黃 人參 桂心

各四兩

各二兩

兩甘草 一兩

炙

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大飲服十九日服三仍
燒鐵烙之

烏魚散

出仁
存方

治重舌

烏魚骨

一兩
燒灰

乾蟻

半兩

蒲黃

半兩

研

枯白礬

一分

研

右研為末每服半錢以鷄子黃調塗舌上嚥津無妨

川硝散

出仁
存方

治重舌及木舌

川朴硝

半兩

真紫雪

一分

鹽

半

右研細每服半錢入竹瀝三兩點白湯調塗舌上嚥津一方治木舌并水調傳之

三物備急丸 治心脾經為時邪所客重舌腫脹語聲

不出水飲不下

大黃

剉炒

乾薑

炮

巴豆

去皮心膜
各等分

右為末蜜丸如菴豆大每服五丸溫水下大便利為

度

蒲黃散

出聖
惠方

治小兒重舌口中生瘡涎出

蒲黃

露蜂房

各一分

白魚

燒灰
一錢

右研令勻用酒少許調傳重舌上日三

秘錄方

出陽氏
寶書

治重舌宜用海螵蛸燒灰以鷄子清

傳患處一方用黃一方生用亦可及治小兒鵝口不乳

治重舌木舌 先用新水擦口并舌上下後用皂角刺燒灰入腦子少許每用半字糝舌上下出涎定消立効

治重舌

出湯氏寶書

用竹瀝浸黃栢點之燄硝亦好

又方 煮小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度

桂礬方 治小兒重舌口中生瘡涎出

方見口瘡等疾類

治小兒重舌方 用桂心半兩為末以薑汁相和令勻
每用少許塗舌下再塗之

治重舌舌強不能收唾 用鹿角末如豆大許安舌下
一日三四度亦治小兒不能乳飲一方用水磨鹿角
服之如小兒鵝口重舌令炙熨之

治小兒重舌 取衣魚塗舌上燒灰塗之亦可

又方 取竈門下黃土末以苦酒和塗舌上愈

又方 取三家猪肉切令如指大摩舌上兒立能啼

又方

出聖惠方

取赤小豆為末醋和調舌上

又方

出聖惠方

燒簸箕灰傳舌上一方用簸箕尖

蒲黃散

出簡易方

治重舌夜啼

用真蒲黃傳上不過三

四次即愈更以溫水蘸熱帛裹指輕輕按掠之然後

糝藥一方用真蒲黃炒過出火毒用之

治小兒重舌欲死者

出聖惠方

用亂頭髮不以多少燒灰

細研末每用半錢傳舌下日數用之妙

治小兒生重舌

用白芨末以乳汁調傳小兒腳心

治重舌鵝口 用馬牙硝傳之日三度

蛇蛻散

出聖惠方

治小兒重舌及重脣重斷腫痛 用樵

炙蛇蛻研末日傳三次舌下一度著一豆許一方用
醇醋點掠舌下愈一方用唾和塗舌上

治小兒重舌

出聖惠方

燒蜚蜋末和唾傳舌上

又方 用黃丹如豆大內管中以安舌下

又方 用木蘭皮一尺廣四寸削去麤皮用醋一升漬

出汁注于重舌上

又方

出肘後方

用粟米嚼哺之

療小兒舐方

用狸骨燒灰和臘月猪脂塗上

治小兒重舌

小兒重舌聽行藏中鎖尋來是仙方火

內燒灰為細末水調喫下便安康

治小兒重舌及口中生瘡涎出方

出聖惠方

取白羊尿塗

少許口中瘥

治小兒重舌重腫方

出聖惠方

取牯牛乳與少許飲之

治小兒重舌

出聖惠方

用甌帶燒灰細研傳舌下

治小兒重舌欲死者方

出聖惠方

用桑根白皮一兩細剉

以水一大盞煎至五分去滓漸漸以匙子抄手許令
兒吮之一方取桑根白皮汁塗口中瘡

治舌卒腫如吹胞滿口溢出氣息不得通須臾不治殺

人

幼
新書

以苦酒一升煮半夏一十枚令得八合稍

稍含嗽吐之宜熱洗去滑用之勿嚙其汁一方加生

薑一兩尤妙

地黃湯 治小兒舌胎舌黃舌出血舌腫舌裂舌芒刺

舌卷舌黑舌赤并理諸舌病

黃芩 生地黃

等分

右咬咀三歲一大錢水半盞煎三分去滓一方加赤芍藥甘草如舌乾燥者調胃承氣湯并人參白虎湯治舌腫強滿宜滿口含糖醋甚良

又方 飲羶羊乳即瘥

治舌卒腫起如吹胞狀滿口塞喉氣息欲不復須臾不治殺人者方 以刀鋒決兩邊第一大脉出血勿使

刺着舌下中央脉血出不止殺人血出數升以燒鉄

令赤熨瘡數過止血

一方用針刺去惡血即愈

又方 含甘草汁佳

治舌卒腫如吹胞滿口溢出氣息不得通須臾不治殺
人急以指刮破漬去汁即愈亦可以鉞刀于前決破
之一云兩邊破之尤妙

治舌腫 以百草霜研細醋調成膏舌上下傳之以針
決出血傳之彌佳一方舌卒腫加鹽和塗舌上下並

瘥一方治腫舌水調塗舌下

升麻煎 治心藏熱舌上生瘡裂破引唇赤

蜀升麻

射干

各三兩

栢葉

切一升

大青

二兩

苦竹葉

切

地黄汁

各五合

生蘆根

薔薇根

白皮

各五兩

生玄

參

三合

赤蜜

八合

右呔咀以水四升煮取一升去滓下玄參汁令兩沸
次下地黄汁兩沸次下蜜煎取一升七合綿惹取汁
安舌上含細細嚥之

傳涎膏 治小兒新生三五日爛舌上白瘡喫奶啼叫

黃丹

一分輕粉一分蜜許

右同勻以飯上蒸一度鵝毛掃入口舌上一二次安
治小兒舌上瘡 取蜂房燒灰屋間塵各等分和勻傳
之

又方 取羊蹄骨中生髓和胡粉傳之妙

治小兒重舌瘡飲乳不得 以白礬和雞子置醋中塗
足底二七即愈

治大人小兒口舌生瘡

龍腦

半分

寒水石

半兩燒細研

右每糝于舌上少許

治小兒舌上瘡 取胡粉末并猪鬃骨中髓傳之日三度

治小兒舌上白羔瘡 用草鵝屎取汁調沙糖服之如

鵝喫穀者不用

治小兒舌瘡

方見本門口瘡等疾類治口吻瘡方下同

治小兒舌上生瘡如粥及重舌并口中生瘡涎出方

三項用桑白皮不以多少擣取汁傳之三兩度一方
塗乳與兒飲之亦可

治小兒撮口但看舌有瘡如粟大者為驗 用蜈蚣汁

刮破指甲研兩頭內差如無生者乾者亦得

治新生小兒未滿月及百日舌生瘡口中白膏厚如紙
者並宜治之 以梔子臘脂少許兒病用女乳汁女
病用兒乳汁同調塗舌上一宿効

牛黃散 治小兒重顴重斷腫痛口中涎出

一名聖散

牛黃

龍腦

丹砂

各一分

鉛霜

半兩

太陰玄精石

一兩

右為末再和研勻每服半錢先于重舌上以鉞鍼破出血用鹽湯洗拭乾然後糝藥于口中神効

又方

玄明粉

太陰玄精石

各一分

鉛霜

半兩

右同研令細少少傳之

二乳飲

治證同前

方見口瘡等疾類

又方 取露蜂房燒灰細研以水和塗口中立愈一方

治重舌以田中蜂房燒灰酒和傳舌一作喉下

又方 取煇煤以水調塗之一方治木舌以醋和煇煤

塗舌上當脫涎膜又塗之以涎膜盡舌如故即止

人參散 治小兒木舌日漸長大滿塞口中

人參

一兩

白茯苓

去黑皮二兩

甘草

一兩

槐花

二兩

白藥子

二兩

白朮

一兩

白芷

半兩

右為散用薄荷汁調于糊塗舌上嚥下不拘時如患

重舌亦可服之

礪砂散 治小兒木舌長大

礪砂

研

甘草

炙各半兩

白芷

二錢

白藥子

二兩

蒲黃

一兩

右為散每服半錢薄荷湯入蜜少許塗下食後服三歲已上每服一錢

朴硝散

治小兒木舌

方見咽喉等疾類

治木舌方 舌廼心之候脾之絡脉于舌臟腑壅滯心

脾積熱熱氣上衝故令腫脹滿口若不急療必至害

人

竹瀝

半合

太醫局紫雪

一分

右研細紫雪以竹瀝和之時抹入口中以盡為度一方半夏醋煎嚔嗽吐即差

治木舌舌忽吐出不復收者又歌曰木舌要可用黃葵更入鉛丹兩自宜七遍點之便可愈神方不假乃為奇用葵花研細黃丹半之同研點七次

木舌金絲膏

治小兒心脾受熱唇口生瘡仍治幕口

唇舌白鵝口重舌木舌以上皆係心脾熱並宜用下項藥傳脚心次服連翹飲子仍與金絲膏刷口內舌上功效用吳茱萸不拘多少為末用釀米醋調塗脚心更以紙貼糊粘傳之立效

一方云重腭一證于上腭令生一肉如指大小赤腫妨食及勿乳斯由熱極而作速宜下之不爾熱毒流咽喉加其腫塞悶絕而死宜服疎風散下之愈

治木舌舌忽吐出不能復收者用竹紙捍巴豆油却

取油紙燃燒煙薰之立止

治小兒木舌長大 用鯉魚一枚去骨切肉作片將魚肉貼于舌上以線繫定

又方

黃蘗

一分細研剉

右以竹瀝漬取汁細細點口中良

治小兒重舌欲死方

烏賊魚骨

一兩燒為灰

右研如粉以雞子黃和塗喉外及舌下

牛黃散 治嬰兒重膠重舌口內腫滿多涎咽喉不利

牛黃 朱砂 龍腦 鉛霜 射香 玄精石

右等分為末刺出血後用水洗拭之然後用此藥傳之朱礬散亦可

治嬰兒木舌 凡療木舌如舌根強直腫滿不能吮乳者先用長針于口內舌根兩角邊刺之令血出

黃丹 朴硝 輕粉 白礬枯

右等分研細針後用此藥摻之



普濟方卷三百六十五

欽定四庫全書

普濟方卷五百六十六 明

周王朱橚 撰

嬰孩唇舌口齒咽喉門

牙齒疼痛等疾

附論

夫牙齒者是骨之所養手陽明足太陽之脉並入于齒若血氣充實則骨髓強盛雖其齒損落猶能更生也若虛弱者血氣衰耗風冷乘之致令齒久不生效令生者或齲或蟲落不能生也小兒齒痛風齲者手陽明太

陽之脉並入于齒風氣入其經脉與氣血相搏齒即腫痛濃汁出謂之風齲小兒牙疳齒齲者是斷腐爛也上牙屬手陽明太陽之經燥金為主下牙為足陽明胃經濕土上下是腸胃二經也或積熱于內或因服銀粉芭豆大毒之藥入乳腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而至于齒斷牙縫嫩薄之反內害也可以麝香玉線子治之乳母臨臥常服黃連解毒湯一服牙疳病則愈矣全嬰方云紀全助教子七歲每夜睡中斷牙其絕生

業醫者累與驚藥并靈寶丹及用聖惠方治睡中斷齒
密取患人臥薦下塵一捻內口中勿令知之亦不退諸
法治之一季無効其妻慮有祟求祝無驗召愚視之則
兩耳前微赤瘡攻必耳聾微黃驚入腎斷齒睡寃中此
子腎經有風腎主骨骨齒也腎有風則齒癢齒癢則咬
牙腎屬陰故夜睡中斷齒知驚入腎也紀曰專醫小兒
實不曉治願請教益答曰以大戟散一錢猪腎湯調臨
睡一服減半次夜更一服退七分後以人牙火燉蝎尾

麝香三味猪腎湯調三服全瘥紀曰大戟散何意也答
曰大戟瀉其膀胱之腑去腎經風腎與膀胱同腎虛不
受瀉故不多服猪腎湯入腎人齒入骨

古者用人牙燒
灰治豆毒入腎

腎旺瘡黑寒顫咬齒者是腎經受毒今用
人牙者逐腎經病蝎尾麝香治腎風邪

大抵用藥當

究其原歸其本素問曰治病必求其本前者所用驚藥
乃治其心所以無効故也 小兒齒不生者用骨之所
終而為髓之所養也小兒有稟氣不足者則髓不能充
于齒骨故齒久不生也

芎黃散 治齒不生齒者由骨之所終髓之所養稟氣

不足則髓不能充于骨故齒久不生

川芎 乾地黃 當歸 山藥 一名山薯芋 白芍藥 各

兩 沉香 半兩 粉草 三錢

右為末溫鹽湯調服半錢用少許揩齒脚亦佳一方無

沉香

牢牙散 搽牙

茯苓 石膏 龍骨 各一兩 寒水石 白芷 各一兩 細

辛

三分

石燕子

大者一枚
小者一對

右為細末早晚刷牙

蟾蜍丸

治齒不生

一名香
附丹

沉香

一兩

檳榔

半兩

雄鼠糞

半兩
燒灰

大香附子

一兩

乾蟾

半兩

燒灰

右為細末用羊髓四兩煮爛和成膏如黍米大每服

十粒麝香湯下量兒大小加減

香附丸

治小兒長齒不生

香附子

大者去皮

沉香

各半兩

檳榔

雄雀糞

兩頭尖者燒各一分

右為末羊髓二兩煮爛和成膏丸如小豆大每服十

丸射香湯下

治大人小兒生齒神效方 用雄雌雞糞各十四顆焙

乾同研如粉入麝香少許仍先以針挑破損齒脚下

血出將散子傳之年高者不過二十日生年少者十

日不計傷損及少自退落並再生

治小兒大人多年牙齒不生 用黑豆三十粒牛糞火

內燒令研盡細研入麝香少許一處研勻先以針挑
不生牙處令血出用末少許揩不得見風忌酸醎物
治因落齒不生 取牛糞中黑豆二七粒去頭上皮以
此豆開處齒注齒根上時時用之即効

又方 取雄鼠糞二七枚以一糞拭一齒根處盡此上
二十一日即生雄鼠屎頭尖一方用雌鼠糞頭圓者
治齒久不生 取雄鼠脊骨為末傳之即生

又方 取路傍遺却稻粒于齒落處點三七下其齒自

生神効

療小兒齒不生 用人尿坑中竹木以正旦刮塗之即

生

含嗽湯 治齒痛

獨活 黃芩 芎藭 當歸 各三分 細辛 葶撥

丁香

各一兩

右咬咀水五升煮取二升半含嗽之食頃乃吐更含之一方有甘草二兩

藁本散 治卒齒痛

藁本 白附子 川芎 莽草

各半兩用搗羅為細末次用青

黛 蘆薈 麝香

各一錢細研

右研勻每用一字塗搯患處

雄黃丸 治小兒牙齒黑蛀氣息疼痛

雄黃

二錢半麝香半錢

右為末軟飲和為挺子安在牙內

治牙疼方 用蒼耳子五升以水一斗煮取五升熱含

之疼則吐吐復含不過劑愈無子莖葉皆可用之

又方 用莽草五兩切以水一斗煮水五升含嗽之一日令盡

又方 用藜蘆末內于牙孔中勿嚥汁神良

又方 用取門下桃掇燒取脂汁少少內孔中以臘固之

治小兒齒牙黑蛙氣息疼痛 含白馬屎隨左右含之
不過三口瘥

治裂齒 以腐棘針三百枚以水二升煮取一升含嗽
之日三五瘥止

又方 取死曲蟾末傳疼處即止

麝香散 治小兒唇口臭爛斷宣露

麝香 雄黃 生蘆薈 白龍骨

各一錢

蜜陀僧 石

二錢

膽

半兩生

乾蟾

一個重半兩者入餅燒存性

右研勻令細先用綿子纏筋頭上以鹽礬漿水輕洗
過然後貼藥

地骨皮散 治骨槽風牙齒宣露腫癢浮動疼痛作時

或斷爛生瘡兼治大人小兒口瘡

地骨皮

麥蘖

各一兩

青皮

一分

猪牙皂角

半兩

右同鹽令勻麤入鍋內燒過再研末每服看患大小
用之仍先以鹽漿漱口了擦

治小兒牙宣齒縫血出

苦參

末一兩

白礬

灰一錢

右為末一日三次揩牙上立驗也

治齒間血出 取苦竹葉不以多少濃煎取汁入鹽少

許寒溫得所含冷即吐

治小兒牙宣常有鮮血不止齒斷臭爛

砒黃

炒一錢

麝香

炒半錢

右同研細先用紙條子以生油塗之後糝藥末在上
少用末剪作小片紙碁子大看大小用插在爛動處
治齒血出不止 刮生竹茹二兩酢漬之令其人解衣
坐乃別令一人含嚙其背上二過并取竹茹濃煮取

汁勿與鹽適寒溫令漱之終日為度

治牙齦宣露出血所以日月蝕未平復時特忌飲食小兒亦然並宜治之用蚯蚓糞水和作稠泥團以火燒之令極赤末如粉以臘月猪脂和傳齒齦上日三即瘥止及治小兒風齲齒痛并蟲食疼痛黑爛

治齒間血出 用童子小便半升分為三兩次含之冷即吐之

治齒根腫痛 取松栢槐枝同燒令熟柱病齒孔須臾

蟲緣枝出

治齒根腫 以松葉一握鹽一合好酒三升煎取一升
含之

治齒根空腫痛困斃

獨活 四兩
三升

右于淨器中漬之塘火煨令暖稍稍沸得半去滓熱
含不過四五度

治牙斷疼痛

杏仁

一百枚去皮
尖兩仁者

鹽末

方寸
七

右以水一升煮令沫出含之未盡吐却更含不過再

三瘥

治小兒牙

牛蒡子

炒香
一分

乳香

一錢

右為末入白麴少許溫水調塗

治牙根腫痛

生地黃

獨活

各三
兩

右切以酒漬一宿含之

治小兒牙 用大礪砂研細水化雞羽掃牙上

治齒根腫痛 常以白鹽末對齒斷上日三夜二

治齒牙根搖欲落 用生地黃大者一寸綿裹着牙上

嚼嚙汁汁盡去之日三嚙十日即愈一方用火炙令

大熱着木椎碎用綿裹着牙上

蝦蟆散 治小兒齒痛齟風連腮微腫

乾蝦蟆

一枚燒灰

青黛

細研

柑子皮

細辛

白鷄糞

薰黃

各一兩

麝香

細研

乾薑

炮裂剉各半分

右為散研令勻以薄綿裹少許內齧齒孔中日一易

之

治小兒風齧齒痛及蟲蝕疼痛黑爛

出聖惠方

青黛

雞糞白

燒灰

藁本

細辛

麝香

少許細研

右為末旋取少許傳于齒上

治小兒齒痛風齧連腮微腫

出聖惠方

白附子

藁本

細辛

芎藭

莽草

各五分

右為散以薄綿裹少許着齧齒上

治小兒齧齒風痛及蟲蝕疼痛

出聖惠方

乾蝦蟇

一枚燒灰

青黛

一分

蘆薈

半分

右同研令細以生地黄汁熬作膏塗齒上

治小兒風齧齒痛及蟲蝕疼痛黑爛

出聖惠方

以郁李根

白皮五兩剉水一盞熱含冷吐當蟲出

又方用松栢脂捏銳如錐柱齧孔內須臾齧蟲緣出

瘥

又方 用雞舌香半兩剉水一中煎六分去滓熱含冷
出

治齲齒

出聖惠方

用白馬懸蹄切碎可孔塞之不過三度

一方用夜眼亦可

又方

出幼幼新書

以皂莢炙去皮子搗末取少許差齒痛

止癢

二聖散 治小兒風虫牙疼

威靈仙

白茯苓

去黑皮各一兩

右為末每用一錢水一盞醋半盞葱白一握切煎至六分熱燂冷吐

黃龍散

治齒斷疳蟲有竅子不合者

出幼幼新書

龍實

龍骨中削之淡黃或淡黃上褐色緊粘人舌者是

白礬

灰

蝸牛殼

南粍

牛黃

各一錢

右為末每用少許貼竅子內時時用之

治小兒齒疳蟲

伍倍子

炙為末

鉛丹

研各一分

右和勻以綿裹貼齒斷上塗亦得

治蟲蝕齒根肉黑方

出幼幼新書

燒腐棘取脂塗之十遍

雄黃末傳即愈者齒黑者以松木灰揩之細末雄黃

塗斷百日日再塗之七日慎油猪肉神効

治小兒風虫牙

出幼幼新書

濃煎郁李仁水含之

治牙車急口眼相引舌不轉方

出幼幼新書

牡蠣

熬

伏龍肝

附子

炮去皮

礬石

燒各等分

右為末以白酒和為丸傳其上乾則易之取瘥止

治失欠頰車蹉

出新書 幼幼

消蠟和水傳之立愈

四物湯

治稟氣不足齒久不生骨髓不生

當歸

白芍藥

地黃

川芎

等分

咬咀水煎加山茱萸甘草服

草龍膽散

治牙根宣露

草龍膽

鈎藤

枳殼

升麻

各等分

右件前水日月灌漱之

越涎散

牙硝

白礬

枯北細辛

各等分

右為末措擦牙上出涎立効

法

治失欠頰車蹉閃不合 用一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出指恐誤嚙傷人指也

治齒䄇方

出幼幼新書

以擔一條令病人蹲坐橫擔于膝

上引兩手尋使極住手伸中指炙中指頭擔上三壯兩頭一時下火病人口誦呪曰噉牙蟲名字鵲莫噉

牙莫噉骨大人亦念之

治牙根腫痛

出幼幼新書

扣齒三百下日一夜二即終身

不發至老不病齒

治痛齒

出幼幼新書

宜夜向北斗手拓地炙指頭地呪曰

蝎蟲所作斷木求風蟲所作灸便休疼痛北斗收即

瘥

治牙痛

出幼幼新書

取桑東南引枝長一尺餘大如匙柄

齋兩頭口中柱着疼牙上以三姓火炙之呪曰南方

赤帝子教我治蟲齒三姓炙桑條條斷蝸蟲死急急
如律令大効

咽喉等疾

附論

夫咽喉者肺脾經所主也小兒脾肺有熱蘊積上焦薰
發喉間故令咽喉赤腫吞吐不利或塞或壅憎寒壯熱
欬嗽痰涎是其候也昔人謂藏熱則咽門腫而塞閉豈
虛言哉 喉痺之病喉中腫塞脾痛水飲不下呼吸有
妨寒熱往來得之風熱客于脾肺熏發咽喉小兒純陽

尤多是疾若不速治毒邪入心則煩悶懊懷立致危殆
歌曰咽喉腫閉肺家殃積熱于中舌有傷風盛氣攻丹
腫毒却愁生出腦疳瘡此患先解利宣泄藏腑壓熱調
氣即安也 人以胃氣為主無問大小兒或有痰實風
涎灌心切不可吐惟喉痺別無治法非吐不能生金星
丸先當投之痺者隔塞也萬一危亟前藥無効急用官
局碧霞丹研細用薄荷自然汁入醋調用雞翎蘸藥送
入喉管內徐徐導引得吐出為佳或云碧霞金虎二丹

能殺人不可用此大不然 小兒馬痺者與喉痺相似
亦是風熱毒氣客于咽喉頷頰之間與血氣相搏結聚
腫痛其狀從領下腫頰下應喉內痛腫塞水漿不下甚
者膿潰毒若攻心則心煩懊悶至死 小兒生下中酢
腮風壅喉渾身壯熱耳邊連珠赤腫喉中或肉瘤起有
此為酢腮喉壅此候本因積熱甚積熱衝上乃如此所治
者先微下奪命散略與吐下風涎用勻氣散補又用硃
砂膏夾天竺黃散與服又用葱涎膏貼腮腫處如此調

理三日即愈如此惡候恐傳急驚方

牛黃散 治咽喉項腫啼聲不出

牛黃

研半分

代赭

三兩

麝香

研半錢

玄參

半兩

厚朴

去麁皮生薑汁

炙三分

升麻

一兩

射干

半兩

大黃

剉炒一分

木香

三分

白朮

半兩

犀角

鎊屑三分

甘草

炙半兩

右為細散入研藥和勻一歲至二歲每服半錢以人
乳汁一蛤蜊殼許調下空服日一服三歲至五歲以
上每服一錢棗湯調下米飲亦得日再

升麻湯 治小兒咽喉腫塞疼痛方

升麻 木通 川大黃剉微炒 絡石葉 犀角屑

甘草微炙剉各一分 石膏三分 川朴剉三分

右搗羅為麤散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不拘時服量兒大小加減溫服

射干散 治小兒脾肺壅熱咽喉腫痛

射干 川升麻 百合 木通剉 甘草炙微赤剉 桔梗

去蘆頭 馬牙硝半兩各一分

右為散每一錢以水一盞煎至五分去滓不計時候
量兒大小以意加減溫服

龍腦膏

治小兒風熱咽喉腫痛塞悶生瘡搖頭燥悶

蟲咬心痛

龍腦

半錢 玄明粉

一錢 牛黃

少許

白礬

一分 銚子內鍊通煎却磨汁泣乾為

度蟬蛻

三十個去足炒研末

蛇退皮

一條長二尺用鐵器上煉焦為度旋除下黑者

生者再焙須緊按實
著鐵器焦後研為末

右同爛研入沙糖少許和九梧桐子大冷水化破一

丸服之

絳雪散 治大人小兒咽喉腫痛氣息難通

硼砂

少許

白礬

如皂子大

馬牙硝

三分硝石

四兩

黃丹

半兩

巴豆

六枚

右竈瓷罐子一個先煨令熱後次第漸漸下藥巴豆
逐個打破後有火焰盡更入一個續入蛇蛻皮一條
謂之七擒以火養成汁候結硬乃成也每用少許竹
筒子吹在患處忌雞犬婦人見唯臘月合之

地龍散 治小兒生熱咽喉腫痛

鬱金

用皂角水煮熟

甘草

炙

白殭蠶

地龍

各一兩

蝎牙硝

一兩

右為細末每用一錢薄荷湯調下兒小半錢

款冬花丸 治小兒咽喉中鳴欬嗽喘急

款冬花

甘草

炙

紫苑

去苗皮

麻黃

去根節煎去沫

倍乾各半兩

貝母

麩炒

麥門冬

去心倍

各三分

右為細末鍊蜜丸如菉豆大每服三丸至五丸食後

米飲下五歲已下以意加之日三服

麻黃湯

治咽喉腫熱肺脹氣急喉中似有物塞

麻黃

去根節煎
去沫焙乾

桑根白皮

剉

桂

去麤皮
各半兩

大黃

生射

干杏仁

湯浸去皮尖
雙仁各一分

右麤擣篩每服一錢以水半盞煎三分去滓溫服

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入

當歸

射干

升麻

各一兩

附子

半兩炮
去皮

白蜜

四兩

右呖咀以猪膏四兩先煎之令成膏下着地勿令大

熱內諸藥微火煎令附子色黃成絞去滓內蜜復火上令相得成器中令凝取如杏子大含之日三四輒嚥之瘥

半夏湯 治小兒咽喉病不利乳哺

半夏

洗二個

棘荊

半升陳者

麥門冬

半兩

人參

甘草

炙各一兩

右呖咀以水三升煮一升稍稍飲之

牽牛散 治咽喉中鳴欬痰壅

牽牛子

炒半生半熟二兩

杏仁

去皮尖雙仁炒

甘草

炙

吳茱萸

湯洗

焙乾
炒

陳橘皮

去白焙
各一兩

右為細末每服半錢空服以沸湯調下微利出惡物
即瘥量兒大小加減服

升麻湯 治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞并治大人咽
喉不利

升麻

生薑

射干

各二兩

橘皮

一兩

右咬咀以水六升煮取二升去滓分三服

玉芝飲子

治小兒膈上壅熱唇口生瘡咽喉腫疼

甘草

劉作半寸許擘破湯浸一日微炒過

吳石膏

研如粉各四兩

山梔子

六兩

去皮炒

藿香

三分

右為細末每服二錢新汲水調下不以老幼加減可

服

射干湯 治咽喉腫痛及風熱上搏于咽喉之間血氣相搏而結腫乳食不下名咽閉方

射干

川升麻

各一兩

馬牙硝

馬勃

各半兩

右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫熱服食

後

備急丹 治咽喉腫疼

青黛

三兩

芒硝

二兩

白僵蠶

一兩

甘草

四兩

右為細末用臘月牛膽汁兒有黃者盛藥其中陰四十九日多時為妙如夢小麥腮喉閉用皂角子研碎以竹筒子吹之咽喉內愈

治小兒卒腫毒着咽喉頸壯熱不乳

升麻 射干

大黃

各一兩

右呖咀以水一升五合煮取八合一歲分三服不拘時候溫服以滓傳腫上冷更煖以傳大兒以意加之青木香湯 療春夏忽喉咽痛而腫兼不利者

青木香 黃連 白頭翁

各一兩

右呖咀水五升煮取一升半分溫三服小兒一服一合忌豬肉冷水

朴硝散 治小兒咽喉舌腫脹咽氣不利

朴硝 分一衣中白魚

炒三少
收鹽許

右為末每服以指搥少許在舌上

龍石散

治大人小兒咽喉腫塞疼痛口舌生瘡上膈

壅熱毒

生腦子

錢一

寒水石

一斤燒一日

朱砂

一兩一分飛研

右為細末每用少許擦患處嚥津無妨小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹掃次用此藥擦立愈

治小兒咽喉腫痛塞悶方

馬勃

半兩

桑株上螳螂窠

一兩燒灰

右同研令勻鍊蜜和丸如桐子大三歲以下每服煎犀角湯研下三九三歲以上漸漸加之

治咽中瘡腫

蓖麻子

去皮一枚朴硝一錢研勻

右用新汲水調作一服未効再服

治咽喉腫痛閉塞

白殭蠶

生出絲青白馬硝各二錢

右為末每服半錢生薑汁調下不拘時服

得効方 凡咽喉之證最急初覺咽喉腫脹痛速宜服此用白殭蠶二味等分為末研生薑水調下一錢不過二服即愈如是噤定牙關用巴莖七粒剝去皮擦巴莖油在四指大四方紙花子上用紅筋斜角卷之却徹去紅筋男左女右簪在鼻孔中存一半外用燈點着外相紙花卷兒頭即時煙透喉中牙關隨手便開以白礬少許吹在喉中壓下熱涎即安此病暴速非其他病之可擬也倉卒害人性命不可不慎

白礬散 治大人小兒風熱咽喉腫痛及卒然閉塞又

治纏喉風急喉閉

白礬

一兩巴豆二十粒餅
內火煨

右為細末每服一字吹入口內或鼻內亦可又一方
同熬枯乾去巴豆礬礬令細冷水調灌

治懸癰乘熱暴腫長

乾薑 半夏

各等分

右末每用少許著舌上又一方白礬鹽等分為末筋頭

點少許懸癰上

黃蘗湯 治咽喉腫脹咽氣不利

黃蘗

去麤皮
蜜炙

甘草

炙各
一分

右麤擣篩每一錢以水半盞煎至三四分去滓溫服
不拘時

苦藥子散 治咽喉腫痛

苦藥子 白僵蠶

等分

右為末每服半錢白礬水調下量兒大小加減

蜂房散 治忽腫毒着咽喉

露蜂房

燒灰

白殭蠶

各等分

右細研每服半錢用乳香湯調下看大小加減

治咽中腫垂內不得食 以竹筒內口中燒鐵從竹中
柱之不過數度愈

一方

全蝎 白薑 蟬退 紫英

右為末入硃砂麝香各一錢研勻燈心湯點服

人參菴活散

治壯熱涎潮牙關緊急

方見本門
傷寒類

蝎附散

治小兒吐瀉日久或大病後生風時發搐搦

目睛斜視

南星

一枚重二兩者打碎

附子

一枚重七錢者生去皮臍剉

已上二味用生薑四兩取汁入好酒一盞于銀石器

中同煎令汁盡焙乾為末

白附子

七枚炮製

全蝎

七枚去毒用炒

代赭石

二兩火煅為末

辰砂

半兩

右為細末入腦子麝香各一錢研勻每服一字用酸

漿水半盞入麻油兩滴冬瓜子三粒同煎三五沸放
冷約一茶腳許調服候少時再服如無漿水并冬瓜
子只用薄荷湯調服亦不拘時候

中風口噤

附論

夫小兒中風口噤者是風入頷頰之筋故手足三陽之
筋入結頷頰足陽明之筋上于口膚腠虛風冷客于諸
筋筋得寒冷則攣急故機關不利而口噤也

方

犀角散 治小兒中風口噤腰背硬強搐搦

犀角屑

獨活

麻黃

去根節

白附子

炮製

乾蝎

微炒

牛

黃

細研已上各一分

天麻

半兩

天南星

半兩

射香

半兩

細研

右為散入研了藥都研令勻不必計時候以薄荷酒

調下半盞蓋覆汗出立驗量小兒大小加減服之

治小兒卒毒腫着喉頸壯熱妨乳 煮桃皮汁三升服

之

治小兒咽喉腫痛塞閉 取牛蒡根細剉擣汁漸漸服

之

治懸癰乘熱暴腫長

用鹽末以筋頭張口柱之日五

治喉卒腫不可食

用韭一把擣熬傳之冷即易之佳

又方

含荆瀝稍稍嚥之

又方

用好酢口內含之舌瘡亦佳

大聖奪命玉雪無憂散

玄參

管仲

白茯苓

去皮

縮砂

甘草

炙

滑石

研別

入山荳根

川黃連

去鬚

荆芥穗

各半

硼砂

二錢

入研

別

寒水石

三兩火煨紅水中淬別入研

右為末次入滑石等三味合和勻每服半錢此藥理
咽喉塞滯口内生瘡心腹脹滿脾積癥塊解百藥毒
如纏喉痺風涎生小兒嘔嗽如辨不消化誤嚥下叫
子魚骨針刺錢等並用藥半錢先抄入口後用新汲
水一口嚥之任是百毒硬物可令除化立有妙効如
要喫巴莖針刺麥粒針瓷瓦子等諸毒藥毒蟲硬
物只用藥半錢與物相拌和喫之用水一口下並無

妨礙但是心腹間有礙亦如前法服之潤三焦消五穀除三尸去八邪辟九蟲起瘟疫專理渴疾除風涎開牙關神效不可具述服者自當知

烏翼散 治喉嚨者脾胃之候若藏熱喉則腫塞神氣不通

生烏翼十兩升麻兩羚羊角兩芍藥各二兩通草各二兩薤

薇根切一升艾葉六銖生者生地黄切五合猪脂二斤

右㕮咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎

取苦酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏仁内
喉中細細吞之凡卒喉痺不得語者宜服小續命湯
加杏仁一兩尤妙

木通湯 治小兒喉痺由脾肺蘊熱血氣結塞慎勿刺
破但此方治之

木通

劉一分

升麻

一分

大黃

劉炒一分

麻黃

去根節一分

犀角

一鎰

分石膏

劉半兩

甘草

炙一分

右麝擣篩每服二錢水一盞煎至七分去滓下朴硝

末一錢攪勻再煎二服分溫二服早食後臨臥各一服五歲以上以意加之

犀角湯 治小兒喉痺咽喉傍腫如澀子身體壯熱如不作顆結空氣急喉中噎塞即是肺脹此方治之

犀角

鎔硝二分

射干

一分

桔梗

炒

絡石葉

升麻

甘草

炙

山梔子仁

各一分

右麤擣篩每服二錢以水一鍾煎至六分去滓下朴硝末半錢攪勻分溫三服早晨日午臨臥各一服又

一方無朴硝有馬牙硝

馬牙硝散 治小兒喉痺疼痛水漿不下

馬牙硝

川大黃

劉微炒

甘草

炙微赤劉

牛黃

細研

馬勃

各一

分

右為細末每服半錢以新汲水下不拘時候量小兒
大小加減服之

羚羊角湯 治小兒喉痺疼痛咽塞不利

羚羊角

鎊硝一分

升麻

三分

射干

白藥

各半兩

陳橘皮

湯浸

去白焙
各一分

右麤搗篩每服一錢以水七分煎至四分去滓分溫
二服早晨日午夜臥各一服五歲以上以意加減
天竺散 治小兒喉痺上焦積熱壅毒

天竺黃 馬牙硝 甘草

炙各半兩

蛤粉

白者二兩

丹砂

研一

分

右為細散每服半錢取新汲水揉薄荷相和入龍腦
少許量小兒大小湯化服之食後臨臥

麻黃湯 治小兒喉痺咽喉傍腫喉中噎塞

麻黃

去根節半兩

桂

去麁皮一分

射干

一分

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒一分

右麁搗篩每服一錢以水七分煎至四分去滓食後服之二次

白礬散 治小兒走馬喉痺

白礬

煅焙研一兩

硝石

研

雄黃

各一分研

苦參末

半兩

右為細末每服半錢冷水調下併三服

治咽喉涎壅喉痺閉等疾

出幼幼新書

鬱金

大者一個為末

輕粉

炒一錢

巴莖七粒

四粒熟三粒生熟者是去油生

用者生

右和合藥先左研四十九遍後亦向順研令勻次入

輕粉每服一字管子吹入喉中

奪命散

出幼幼新書

治小兒喉閉亦治大人

朴硝

白礬

天南星

各半兩

右為末小兒每服半錢水一鍾同煎二分大人水一

鍾藥三錢煎七分一服

三物丸

一名三物備急丸

治喉痺水漿不下備急

方見本門前舌腫等

疾類

治喉痺嚙唾不得

出幼幼新書

用半夏一味十四枚鷄子

一枚扣其頭如栗大出却黃白內半夏于中內醋令滿極微火上煎之取半小冷飲之即愈

療小兒喉痺熱塞

升麻

五兩切

馬蘭

一合

右以水一升煎取二合入少白蜜與兒服之甚良

治小兒咽腫喉痺 以鯉魚膽二七枚和竈底土以塗

咽喉立瘥一作鮠魚膽

如聖湯

出幼幼新書

治喉閉舌頰腫咽喉有血欬嗽膿血

甘草

炙二兩

桔梗

一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服急切
不以時日二三張銳雞峯方二味等分

治小兒喉痺腫痛

桂心

杏仁

各等分

右為末綿裹如棗大含嚙汁舌下須臾破又一方無

杏仁

治喉痺卒不得語 以酒三合和入乳汁半升分二服

治馬喉痺 燒馬蘭根灰一方寸七燒桑枝瀝汁和服

治喉痺嚙唾不得 含蜀升麻一片立愈 用木賊以

牛糞餅子火燒每三兩莖纔勻着便取出再取燒為

末每服一錢冷水研米汁清調下小兒臘茶清調下

半錢入口腫破血出即安三日內未得喫粟米粥飯

治喉閉

出幼幼新書

用馬蘭子為末每服半錢麥門冬熟

水調下一方治小兒卒腫毒着咽喉壯熱妨乳用馬

蘭子半兩水一鍾煎至半鍾去滓不計時候溫服量

小兒大小加減

治喉痺獨附煎

出幼幼新書

取附子一枚去皮蜜塗火炙

令乾復塗蜜炙須臾含嚥汁愈

治喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺

出幼幼新書

以馬

啣一具水二升煮取一升分三服

又方

出幼幼新書

以馬鞭草根一握勿中風截去頭搗取

汁服

治咽喉熱腫神氣不通

出幼幼新書

以臘月猪尾燒末水

服之

又方

出幼幼新書

燒牛角末酒服之凡小兒飲乳不快覺

以喉痺者亦取此灰塗乳上令兒食乳嚥下即差

海上方用沙牛角燒刮取灰細研水調亦得

又方

出幼幼新書

熬杏仁令黑含或末服之

治喉痺卒不得語

出幼幼新書

濃煮桂汁服一升亦可末

桂着舌下漸嚥之良

又方

出新書出幼幼

煮大豈汁含之無豈用豉亦佳

又方

出新書出幼幼

燒吹簞作灰三指撮水服之

又方

出新書出幼幼

用芥子末水和傳之乾則易

又方

出新書出幼幼

用商陸苦酒熬令濃熱傳之

治小兒喉痺腫痛

出聖惠方

用露蜂房燒灰以乳汁和一

錢服之看兒大小加減不計時

又方

出聖惠方

燒蛇蛻末以乳汁服一錢不計時候

治小兒喉痺

用葛蔓燒灰水服一錢

又方

用棘刺燒灰水調服半錢

治喉痺

以繩纏手大指刺出一大荳以上瘡去小指

亦佳刺小指爪文中出血即差左右刺出血立愈慎

酒麵毒物

異功散

治纏喉風酢腮喉閉及咽喉一切病症

盆硝

一兩

甘草

炙六錢

訶子肉

白殭蠶

貫衆

馬

勃

蛇蛻皮

點油醋慢火炒黃色各半兩

礪砂

玄精石

各一錢

右為末每服用一字以蘆筒子吹咽喉內纏喉風磨刀水調下半錢尋常置舌根下用

解毒雄黃丸 治纏喉風及急喉痺卒然倒仆失音不語或牙關緊急不省人事

雄黃

飛

麝金

各一分

巴莖

去油二七個

右為末醋煮麵糊為丸如菜莖大用熱茶清下七丸吐出頑涎立便蘇省未吐再服善治纏喉風及走馬

喉閉卒死倒地失音不語以至牙關緊硬不知人事
如至死者心頭猶熱灌藥不下即以刀鍼匙幹開口
灌之但藥下喉嚨無有不和吐瀉夢小無妨及上膈
壅熱痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱並宜
服之如小兒患喉嚨赤腫及驚熱痰涎壅塞二九或
三九量兒大小加減

生薑飲 治風邪風毒纏喉不語

南星

畧炮
半兩

生薑

四錢

橘皮

三錢

右剉每服三錢紫蘇五葉煎服

治纏喉風喉痺牙宣牙癰走馬疳口瘡等 用蠶退紙

燒存性少入龍腦蜜丸如鷄頭大含化小兒減少如
牙宣癰腫揩貼斷上如走馬疳加麝香擦貼立愈

治小兒急喉閉及纏喉風

玄參 鼠黏子

半生半熟炒
為末各一兩

右為末新汲水調下立瘥

治纏喉風咽中如束氣不得通

蛇蛻

炙

當歸

切焙等分

右為末溫酒調一錢得吐為良未効再作切忌針灸
纏喉風藥 以火炊草一大把舂爛用水一鉢衝取汁
漱咽中漸寬即下小續命湯入蔓荊子何首烏薄荷
荊芥各少許與小續命湯多少相等嚥下使一人守
之連數服腫消乃退

治噎方 用酥蜜生薑汁升一微火煎二沸每服兩棗
許內酒中溫服之

治尸咽語聲不出 用酒二合酥一匙薑末一錢和服
之日三食後服亦治肺病

治噎方 以手巾布裹舂杵頭糖拭齒

治尸咽喉中癢痛吐之不出嚥之不入如中蠱毒方

含生薑五十日瘥

勾藤散 治風熱喉痺

勾藤 玄參 升麻 黃芩 赤茯苓 苦梗

甘草 山梔子

各等分

右為末煉蜜為丸如皂角子大每服燈心一子淡竹葉薄荷湯化或細研雄黃調下

越涎散

鴨嘴膽礬

烏梅

一個大者去皮用巴豆三粒去殼入布裏慢火煨去巴豆用

右為末用黃秋串根煎吞醋調少許點入口內令含
嚥少頃必吐出痰

治小兒重脛重斷腹痛 以蛇蛻炒末傳之效

語音不出等疾

附論

夫心為言肝為語其經屬手少陰足厥陰其氣上通于舌舌者聲之機若稟受之初母懷驚怖則子之心火不足而肝木弱故令機關不利氣不宣揚而語遲甚者有經數歲不能言者蓋咽喉者氣之道路喉揜者聲音之門戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客于喉揜即不能發聲故卒然而失音錢氏云口噤不語失音也孫氏云口開不語音啞也閉目不語卒疾而失音目開不語久病而無聲有口開失音為風邪客于肺肺主聲而通

于氣令外邪與真氣相搏真氣虛而邪氣勝故聲不通
有因病吐瀉大病之後雖有聲而不能言又能嚥藥此
非失音為腎怯不能上接于陽故也當補腎地黃丸癰
病瘥後不語者為風邪流滯于心絡使心氣不和其聲
不發又云寒客于喉揜啼聲以啞人其有驚風盛發因
此不作聲者蓋風涎灌于心肺也宜吐之急驚先吐後
補驚癰先補後吐吐後再補有慢驚瘥後不語者並與
對證驚藥并服通關散自然聲出首尾補助安神膏驚

藥擇用之 夫腎虛為病不能納諸氣以歸元故氣奔而上欬嗽痰壅或喘或脹髓虛多唾足冷骨痿胃腹百骸俱為之牽制其嗽愈重其氣愈乏其聲愈乾君子當于受病之處圖之可也按錢氏方小兒吐瀉利其小便過多以致脾虛不食錢用益黃散作效數日以後忽爾不語錢知其脾氣已復腎氣尚虛投以地黃丸益腎相繼數劑于是能言

方

人參平補湯 治腎虛聲不出

人參 川芎 當歸 熟地黄洗曬 白芍藥 白茯苓

苓 兔絲子酒漫爛研細 北五味子 杜仲去麁皮剉薑汁製炒

去絲 巴戟酒浸 橘紅 半夏曲各半兩 牛膝酒浸焙 白朮

補骨脂炒 葫蘆巴 益智仁 甘草炙各二錢半 石

菖蒲一錢半

右剉細每服三錢薑五片棗二枚食前煎吞山藥丸七十粒五更頭腎氣開不得咳嗽言語默然再進上

藥

杏仁煎 治咳嗽暴重聲音不出

杏仁

水浸去皮研膏

冬蜜

沙糖

薑汁

各一盞

桑白皮

去亦

炒木通

貝母

去心各一兩半

北味子

紫苑茸

各一兩

石

菖蒲

半兩

右呶咀以水五升煎半去滓入杏薑糖蜜夾和微火煎取一升半每服三兩日夜服之

木通湯 治諸風失音

木通 石菖蒲 防風 羌活 桑螵蛸 全蝎

直僵蠶

炒各三分

甘草

炙三分

圓白南星

畧炮半兩

右剉每服二錢半紫蘇五葉薑五片水煎熱服之

荆蘇湯 失音通用

荆芥 蘇葉 木通 橘紅 當歸 桂 石菖

蒲

右等分剉水煎四錢服之

僵蠶散 治小兒失音不語關膈不通精神昏憤

殭蠶

半兩

羗活

一錢

麝香

半錢

右為末三歲半錢薑汁少許調和沸湯浸服又以芎
藭末着舌根上頻用之

又方 以細辛去苗為末先用皂角一莖去皮淨刷子
蘸少水就上刷令珠起然後以指蘸皂角珠點細辛
于牙緊處擦之

千金湯 治小兒失音不語 以桂心呔咀每服一錢
水半鍾煎三分去滓無時十歲兒服為末着舌上即

語又竹瀝飲之並瘥

治氣腸聲沉 用心氣湯加枳殼甘草水煎服之

金花散 治失音亦治喉痺 用槐花新瓦上炒香熟

三更後床上仰臥隨意食之熱證通用並驗

菖蒲丸 治受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒加受

母氣心官不守舌本不通四五歲長猶不能言

人參 石菖蒲 麥門冬 去心遠志 取肉薑 川芎

當歸

各二錢

滴乳香

朱砂

各一錢
細研

右為末蜜丸麻子大每服粳米飲下十九

菖陽丹 治小兒數歲不語

石菖蒲

一寸九節

遠志

去心

桂心

去皮各一兩

人參

黃耆

酸棗仁

炒去皮

黃連

各半兩

右為末鍊蜜丸雞頭子大每服一丸用生薑湯化下
不拘時服

菖蒲丸 治小兒心氣不足五六歲一能言舌本無力

發轉不得

石菖蒲

錢三

人參

去頭焙
半兩

丹參

錢三

麥門冬

去心一
兩焙秤

天

門冬

去心
一兩

赤石脂

錢二

右為末煉蜜丸菴荳大或麻子大溫水下五七丸至
一二十九不計時日三四服取又有病後腎虛不語
宜兼服錢氏地黃丸一方加黃連一方無人參

芍藥湯

治小兒心氣不足舌本無力語遲

赤芍藥

兩一

黃耆

劉三
分

犀角

鎰

檳榔

劉

甘草

炙各
半兩

右麤擣篩每服一錢水一小鍾煎至五分去滓量兒

大小不計時加減溫服

治小兒五六歲不語者為心氣不足舌本無力氣轉不
得用赤小豆搗羅為末以酒和塗于舌上即語神
効

桂葛散

治小兒急中卒風失音不語立効

一名二
物湯

桂心

去皮
一兩

石菖蒲

一分

右為末三歲一錢水半盞煎三分不拘時候若大病
之後不語者用猪膽汁調下未語再服一方治風寒

邪氣留滯失音無語猪膽汁調

菖蒲散

治小兒卒然喑啞

以菖蒲為丸五歲一錢

麻油泡湯調下如卒然不語吐出風涎即瘥用好竹
瀝飲之亦治禁口心熱不語

粉薑散

治小兒急中卒風不語

以粉乾薑為末安

少許在舌上時時用之立効

鷄頭丸

治小兒諸病後不能語

雄鷄頭

炙

鳴蟬

三個

甘草

一兩

大黃

一兩

取實處

當歸

去蘆頭三分兩切焙

木通

半兩

黃香

切焙

川芎

遠志

去心

麥

門冬

去心焙各三分

人參

半兩切去頂焙

右為細末鍊蜜丸小荳大旦米飲下五九空心日進三四服兒大者加之九服効鷄蟬二物宜求死者用之不可旋殺孫真人所謂殺生求生去生更遠不可不知也

犀角地黄散

治血證心忪語短眩冒迷忘

生地黃

四兩淨

犀角

牡丹皮

芍藥

右剉每服四錢入桃仁去皮尖七粒煎服如無犀角以升麻代之亦治吐血衄血

治蠱桃仁湯

治狐惑蟲食其臟唇生瘡其聲啞

桃仁

浸去皮

槐子

艾葉

各一兩

大棗

十五枚

右用水二中煎至一中半分三次服之

治濕證聲啞

以不換金正氣散加石菖蒲水煎服如

寒證啞加桂少許治之

治痰症聲沉

以二陳湯加石菖蒲水煎吞白丸子妙

治小兒遲語

取白勞所踏枝鞭小兒令速語

治小兒久不語

取百舌鳥主蟲咬炙食之

治孩兒語遲

用社稷酢酒以少許喫

治伏暑發熱汗渴暑入心胞不語 以小柴胡湯加茯苓

苓水煎服之

普濟方卷三百六十六